

КРАСНУХА

Одна из самых легких инфекционных болезней. Однако в последнее время возросло интерес в краснухе особенно беременных женщин, которые рождаются дети краснухой. Фильтрирующий вирус является возбудителем. Колтагидность меньше чем корь. Передается воздушно-капельным путем. Заразный период начинается за 2 дня до начала заболевания. Чаще болеют дети от 3 до 10 лет. Остается стойким иммунитет. Беременные женщины могут, переносит краснуху слабо выраженным бессимптомным форме, что представляет большой опасностью для плода.

Клиническая картина

Инкуб-ый период от 12-21 дней, может быть до 24 дней. Продромальный период длится от несколько часов 1-2 сут. Часто проходит незаметным иногда отлично недомогание, насморк, умеренный боль горлы. Начало болезни характеризуется появлением сыпи. Сыпь по виду напоминают коревую выступ единичны на лице. При заболевании за беременной первые 3 месяца беременности у зародыша развиваются хроническая краснушная инфекция.

Профилактика

Беременным женщинам надо оберегать себя. Если она заразилась, с целью профилактики рекомендуется ввести гаммаглобулин от 10 до 20 мл. Осложнение обычно не наблюдается.

Самочувствие удовлетворенное.

Лечение больного укладывают в постель на все время, пока у нее повышенная t-ра.

Назначают общую диету, ванны.