

# ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез – хроническое заболевание который вызывается микобактерией туберкулеза. Это микобактерии очень устойчива, она сохраняется во внешней среде при различных колебаниях t-ры, высыпанию мохр. больного.

Заражение происходит чаще всего воздушно капельным путем. Заражение t. в. с. чаще всего происходит в детском возрасте. Начальный пер. t.в.с. инфекции длится от 3 недель до 2-3 мес. У ребенка субфебрильная t-ра, ухудшение афериста, повышенная утомляемость, беспокойный сон иногда упорная диспепсия. При тяжелой течения наблюдается поражение многих органов легких плевры, кишечника, костей, мозговых оболочек. Наряду с врачебным наблюдением установлению диагноза помогает рект-ое исследование ребенка, проводимое в случае надобности, по назначению врача.

## Профилактика туберкулеза

Исключительное значение имеет обязательная противотуберкулезная вакцинация новорожденных. Против t.в.с. прививка проводится вакциной из живых сильно ослабленных t.в.с. бактерий (ВЦЖ) для проф. t. в. с. большое значение имеет ограждение детей от контакта с больными t. в. с. больными t.в.с. не допускается к работе в детских учреждениях.

## Лечение

В 1-очередь следует организовать широкое пользование воздухом в течение всего года. Питание должно быть полноценным. Правильное питание, режим и хорошо организованная. Воспитательная работа способствует выздоровлению ребенка. В случае необходимости врач назначает специальное лечение.